


ESTADIS FENO LòGICS DE L'AMETLLER



Font: El Almendro. Manual Técnico. M. Muncharaz Pou, 2004.

- A Repòs hivernal.** Botó floral en repòs, o gemma completament inactiva. Sols són visibles les bràctees externes.
- B Gemma inflada.** La gemma s'infla augmentant la seva mida
- C Botó verd.** Apareix el calze. El botó segueix augmentant de mida i es va allargant. Es fan visibles els sèpals.
- D Botó rosa.** Apareix la corol·la. A mesura que creix el botó es van separant els sèpals i apareix la corola, amb els pètals encara tancats.
- E Inici de floració.** Els pètals comencen a obrir-se deixant veure els estams tancats i l'estigma.
- F Flor oberta.** Els pètals es despleguen completament. Es produeix la dehisència dels estams alliberant el polen.
- G Caiguda de pètals.** Amb la caiguda de pètals també es dona la caiguda de l'estil i els estams es panseixen i s'assequen.
- H Fruit quallat.** L'ovari fecundat augmenta la seva mida ràpidament, provocant la ruptura del calze i el seu despreniment.
- I Fruit jove.** Fase de ràpid creixement del fruit.
- J Fruit desenvolupat.** El fruit assoleix la mida definitiva i es produeix la lignificació de l'endocarpi (òs) i la formació dels cotiledons.
- K Fruit dehiscent.** La llavor ja ha madurat. S'inicia la dehisència del mesocarpi (embolcall verd carnós).
- L Maduresa.** Fase de desecació del mesocarpi i del peduncle. Es produeix la capa d'absicció entre fruit i peduncle que facilitarà la caiguda.